



Faz 1

**Acil tedavi ile ilgili görüşmeler ve
kararlar tamamlandı
ve belgelendi**

**Yanıtsız ve normal
solumuyor**

**Resüsitasyon ekibini
çağırınız
COVID-19'u belirtiniz**

**Ritmi
değerlendiriniz**

**Şok uygulanabilir
(VF/Nabızsız VT)**

**Spontan dolaşımın geri
dönüşü (SDGD)**

**Şok uygulanamaz
(NEA/Asistoli)**

3 şoka kadar

**Acil kardiyak arrest
sonrası tedavi**

- ABCDE yaklaşımını kullanınız
- SpO2'yi % 94-98 hedefleyiniz
- Normal PaCO2'yi hedefleyiniz
- 12-derivasyonlu EKG
- Presipite eden nedeni tedavi ediniz
- Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi
- AYİ müdahaleleri için AYİ KKE

**KKE'yi giyiniz
2 dk KPR**

Kesintileri en aza indiriniz

**KKE'yi giyiniz
2 dk KPR**

Kesintileri en aza indiriniz

**Faz 3
AYİ KKE**

KPR sırasında

- Yüksek kaliteli göğüs kompresyonlarından emin olunuz
- Kompresyon kesintilerini en aza indiriniz
- Oksijen veriniz
- Geri göndürülebilir nedenleri, 4H ve 4T, düşününüz
- Dalga formu kapnografisi kullanınız
- Sürekli kompresyon yapıldığında ileri Havayolu yöntemlerine geçiniz
- Vasküler erişim (İV veya İO)
- Her 3-5 dakikada bir adrenal veriniz
- 3 şoktan sonra Amiodaron uygulayınız

Önerilen KKE

2. Düzey KKE
 - Tek kullanımlık eldiven
 - Tek kullanımlık önlük
 - Sıvıya dayanıklı cerrahi maske
 - Koruyucu gözlük
3. Düzey AYİ (Aerosol Yayan İşlemler) KKE
 - Tek kullanımlık eldiven
 - Tek kullanımlık uzun giysi (cerrahi önlük)
 - Filtreli yüz maskesi (FFP3)
 - Koruyucu gözlük

Düşününüz

- Ultrason görüntüleme
- Transfer/tedaviyi kolaylaştırmak için mekanik göğüs kompresyonu
- Koroner anjiyografi ve perkütanöz koroner girişim
- Ekstrakorporeal KPR