

YENİDOĞAN YAŞAM DESTEĞİ ÖNEMLİ MESAJLAR



Kordonun klemplenmesini en az 60 saniye geciktirin

Daha uzun süre faydalı olabilir
Kordon sağımı yok <28 hf

Ebeveynleri dahil edin

Doğumdan önce, doğum sırasında ve
doğumdan sonra iletişim çok önemlidir

Beklenmedik hastane dışı doğumlar farklı bir yaklaşım gerektirir

Hipoksemi ve hipoterminin önlenmesine
ekstra dikkat edin

32 haftadan küçük bebekler için farklı bir yaklaşım gerekir

Plastik torba, CPAP, daha düşük inflasyon
basıncı, daha yüksek oksijen

YENİDOĞAN YAŞAM DESTEĞİ

Kurutun, sarın, uyarın ve sıcak tutun

Çoğu bebeğin doğumda ileri yardıma ihtiyacı
yoktur

Solunum ve kalp atım hızını değerlendirin

Bu, sonraki adımlara rehberlik edecektir

Hava yolunu açın ve akciğerleri ventile edin

Bunlar, geçiş sürecinin desteklenmesi ve yenidoğanın
resüsitasyonu için temel basamaklardır

Göğüs kompresyonu ve ilaçlara nadiren ihtiyaç duyulur

Umbilikal ven tercih edilen vasküler erişimdir